



Bijlage 3:


Kaarten behorend bij Boomeffectanalyse






Fruitbomen (Kers en Pruim) met matige conditie
Reden: boomwonden of kwijnend

Deze bomen kunnen worden verwijderd



Fruitbomen (Kers en Pruim) met slechte conditie
 Reden: geïnfecteerd door Boomgaardvuurzwam *Phellinus tuberculosus*

Deze bomen kunnen worden verwijderd



Inheemse boomsoorten

Rood kader = Zwarte els *Alnus glutinosa*

Blauw kader = Es *Fraxinus excelsior*

Groen kader = Walnoot *Juglans regia*

Bruin kader = Ruwe berk *Betula pendula*

Paars kader = Grove den *Pinus sylvestris*

Zwarte els kan worden gehandhaafd


Es kan worden gehandhaafd, maar zal op termijn te groot en te hoog worden

Walnoot kan worden gehandhaafd

NB: Er staan er twee. De kleinste kan het best worden verwijderd of worden herplant op een andere plek.

Ruwe berk kan worden verwijderd

Grove den kan worden gehandhaafd



Overzicht exoten

Rood kader = Laurierkers *Prunus laurocerasus*

Blauw kader = Conifeer *Thuja spec.*

Paars kader = Vlinderstruik *Buddleja davidii*

Groen kader = Douglasspar *Pseudotsuga menziesii*

Bruin kader = Diverse soorten. Waaronder *Taxus baccata*, Himalayadeder *Cedrus deodara*, Blauwe ceder *Cedrus libani*

Laurierkers kan worden verwijderd

Coniferen kunnen worden verwijderd

Vlinderstruik kan worden verwijderd of werden herplant

Douglas kan worden verwijderd

Overige soorten kunnen worden gehandhaafd. Met name de beide ceders kunnen uitgroeien tot fraai bomen