



1. De aanleg van een besdragende struweelhaag (zonder beheer uitgroeïend tot 4-5 meter hoogte), aan de westzijde van het nieuwe oprit;
2. De aanleg van struweel;
3. De aanleg van struweel met enkele overstaanders;
4. De aanleg van hakhoutstruweel met overstaanders;
5. Bestaande eiken;
6. De aanleg van hakhout met overstaanders (deels bestaand)

Ad. 1


De aan te planten struweelhaag bestaat uit 2 à 3 rijen gemengde, inheemse streekeigen beplanting. Deze wordt in zogenaamd 3-hoeksverband op een onderlinge afstand van ca 1,0 - 1,5 meter geplant. De voorgestelde besdragende soorten kunnen zijn: Kardinaalsmuts (struikvorm), Hondсроos (struikvorm), Veldesdoorn (struikvorm), Meidoorn (struikvorm), Gelderse roos (struikvorm) en Sprokehout (struikvorm).

Ter hoogte van de dubbele woning van Hummelink is sprake van een bestaande situatie met bestaande zichtlijnen. Ook hier wordt langs het nieuwe oprit struweel geplant met toepassing van de soorten Kardinaalsmuts (struikvorm), Hondсроos (struikvorm), Veldesdoorn (struikvorm), Meidoorn (struikvorm), Gelderse roos (struikvorm) en Sprokehout (struikvorm). Het struweel op deze locatie wordt, met behoud van bestaande zichtlijnen, onderhouden door toepassing van gefaseerd beheer/ dunning zodat mevrouw Hummelink niet geheel opgesloten raakt in het groen.

Aangezien de ontwikkeling ter hoogte van de kavel van Waenink nieuw is, heeft initiatiefnemer aangegeven om in overleg met de directe buurt, het beschreven struweel voor circa 20 % bij te mengen met de in de winter groenblijvende inheemse soorten Liguster en Hulst (zie bijgevoegde referentie).

Tevens is afgesproken om hier om de circa 10 meter een boomvormende Veldesdoorn bij te planten op 2 meter uit de eigendomsgrens.

Het beheer ter hoogte van de locatie van Waenink zal gericht zijn op het ontstaan van een robuuste struweelhaag met overstaanders (Veldesdoorns) welk op een natuurlijke wijze de zichtlijnen vanaf de Haare zal breken. Hiertoe zal er hier periodiek en gefaseerde dunning (door afzetten) moeten plaatsvinden van de struikvormers, ten einde te voorkomen dat door onderlinge lichtconcurrentie een holle struikenhaag ontstaat. De afgezette struiken lopen weer krachtig uit en vormen een blijvend robuuste struweelhaag. De aangeplante boomvormers worden gespaard tijdens deze dunning.



Referenties Liguster en Hulst

