

Bijlage 3: Inpassingsplan Bergseweg 15 te Made (versie 13012012)



Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Voor een eensluidend uittreksel, BREDA, 2 februari 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Bijlage 3: Inpassingsplan Bergseweg 15 te Made (versie13012012)

Samenstelling bosje

Percentage	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
20%	Quercus robur	Inlandse eik
10%	Alnus glutinosa	Zwarte els
10%	Acer campestre	Veldesdoorn
10%	Viburnum opulus	Gelderse roos
20%	Corylus avellana	Hazelaar
10%	Amelanchier canadensis	Krent
20%	Euonymus europaeus	Kornoelje

Oppervlakte inpassing

De oppervlakte van de inpassing bedraagt 1.400 m².

Maatvoering

De maatvoering van de stuikvormers is 60/80 bij aanplant en van de boomvormers is 10/12.

Aanplant en beheer

Algemeen

Dit zijn soorten die of in een rij of per oppervlakte beplant worden.

Boomvormers

Berk, Es, Els, Eik, Beuk, Esdoorn zijn boomvormers die ook in een beplanting met struiken kunnen voorkomen. De boomvormers dient men als ze gemengd worden geplant met struiken in het midden van een beplanting (niet aan de rand dus) aan te leggen.

Struikvormers

Gelderse roos, Sleedoorn, Kardinaalsmuts, Hondсроos en Egeltier zijn soorten die aan de rand van een beplanting het beste resultaat leveren. De Krent, Vuilboom, Hulst, Lijsterbes, Kornoelje en Hazelaar zijn de soorten die beter schaduw verdragen kunnen. Het is dan wel raadzaam om deze soorten in groepjes (wanneer mogelijk, 3-5 stuks) aan te planten.

Onderhoud

De beplanting begint klein, na 2 tot 3 jaar echter zal de beplanting gesloten raken (d.w.z. de takken van de beplanting elkaar raken). Op dat moment moet er worden gesnoeid.

Om een beplanting te krijgen van bomen met daaronder een struikenetage dan zullen de struiken/boompjes die moeten worden behouden vrij te stellen door, wanneer de beplanting gesloten raakt, de omliggende beplanting af te zetten op 15-20 cm boven de grond. Laat de beplanting weer in sluiting komen en herhaal dan deze ingreep. Op deze manier ontstaat er een mooie dichte beplanting met opgaande soorten. Dit snoeien kan het beste in het najaar plaatsvinden.