




PERCEELGEGEVENS
 GEMEENTE: BERGEIJK
 SCHAAL: 1:500
 SECTIE: I
 NUMMER: 1250



LANDSCHAPSPLAN OUDE POSTELSEWEG 19-21 BERGEIJK

Datum: 14-10-2019

Fam. Lemmens
Weebosserweg 52
5571 LN Bergeijk

Aan het perceel van Fam. Lemmens op de oude postelseweg word een strook van 2 meter breed en 30 meter lang aangeplant voor landschappelijke inpassing. Het word zo aangeplant dat we nog voldoende doorkijk hebben op het perceel. Er worden 2 rijen beuken geplant (5 planten per m1) als haag met daarin 4 Quercus robur (zomer eik) maat 20/25. Verder staat in het perceel een bestaande bomengroep van Quercus robur het betref oudere bomen met een grotere omtrek van de stam. Aan het verlengde van de bestaande bomengroep komt een struweelhaag geplant met de volgende soorten (zie tekening). De plantafstand van de struweelhaag 1 plant per m2

Struweelhaag in soorten	Nederlandse naam
Amelanchier lamarckii	Krent
Philadelphus coronarius	Boerenjasmijn
Viburnum opulus	Gelderse roos
Ilex aquifolium	Hulst
Rosa canina	Hondsroos
Seringa Vulgaris	Sering

Amelanchier lamarckii **Krenteboom**

Familie: rosaceae lamarckii: mannelijk herkomst: noord – amerika

Heester bloeikleur/sierwaarde: witte bloemtrossen groen blad doosvrucht
Bloeitijd: 4-5 hoogte: 350cm

Heester met een open structuur zodat hij geen donkere indruk maakt
Uitdunnen in winter

Cultuurhistorie- sinds de 19^e eeuw in cultuur in parken en in de natuur
Ecologie - bessen voor vogels
Educatie- mooie bloei en herfstkleur



Philadelphus coronarius
Gewone boerenjasmijn

Familie: Hydrangeaceae coronarius= met een kroon herkomst: Kaukasus

Heester bloemkleur/sierwaarde: wit groen blad doosvrucht
 Bloeitijd: 5-6 hoogte: 300 cm

Grote bloeiheester met prachtige witte trossen geurende bloemen
 Verjongingssnoei in maart

Cultuurhistorie - al sinds de 16e eeuw in cultuur in tuinen en parken, boerenerfsoort
 Ecologie - nectarplant voor hommels en honingbijen
 Educatie - plukbloem, geurend



Viburnum opulus
Gelderse roos

Familie: Caprifoliaceae opulus = oude naam voor sneeuwbal herkomst: Europa

Heester bloemkleur/sierwaarde: wit, rode bes groen gelobd blad rode vruchten
 Bloeitijd: 5-6 hoogte: 500 cm

Inheemse vrij wilde heester, vlakke witte bloeschermen met steriele randbloempjes , rode bessen, mooie herfstkleur
 Verjonging of correctiesnoei in voorjaar

Cultuurhistorie - inheemse heester van licht vochtige tot natte bodems langs beken en rivieren, ook in landschap
 Ecologie - nectar leverancier, waardplant voor vlinders, bessen worden pas na strenge vorst door lijstera
 Educatie - mooie bloeschermen en bessen om te plukken, bessen niet eetbaar



Ilex aquifolia

Hulst

Familie: Aquifoliaceae aquifolia= met scherpe bladeren herkomst: Europa

Heester bloemkleur/sierwaarde: wit donker groen blad rode bes
 Bloeitijd: 6-7 hoogte: 400 cm

Wintergroene heester met witte bloemen en rode bes
 Beschutte groeiplaats op humusrijke, wat leenhoudende grond

Cultuurhistorie - inheemse heester van leemhoudende zandige bodems, lang in cultuur
 Ecologie - drachtplant voor hommels en bijen
 Educatie - mooie rode bessen, maar wel giftig!



Rosa canina

Hondsroos

Familie: Rosaceae canina = honds herkomst: Europa

Heester bloemkleur/sierwaarde: rose donkergroen blad oranjerode bottel
 Bloeitijd: 6-7 hoogte: 200 cm

Wilde inheemse heesterroos met mooie bottels, zeer variabel
 Vrij uit laten groeien of eventueel in maart oude, zwakke en dode takken verwijderen

Cultuurhistorie - algemene inheemse roos, lang in cultuur en algemeen aangeplant in parken en openbaar groen
 Ecologie - insectenlokker, bessen voor vogels
 Educatie - scherpe stekels, mooie bottels



Syringa vulgaris **Sering**

Familie: Oleaceae

vulgaris=algemeen

herkomst: Balkan

Heester

bloemkleur/sierwaarde: paars, roze, wit

groen blad

doosvrucht

Bloeitijd: 5-6

hoogte: 300 cm

Breed uitgroeiende heester met dubbelbloemige trossen met sterke geur

Correctiesnoei na de bloei in het voorjaar

Cultuurhistorie - in cultuur sinds de 16e eeuw, bekende park en boerenerf heester

Ecologie - nectarplant

Educatie - sterk geurende plukbloemen



Aan de voorkant van de struweelhaag worden 6 hoogstam fruitbomen geplant in soorten.

Wettenschappelijke naam

Nederlandse naam

Pyrus communis

2x peer

Malus domestica

2x appel

Juglans regia

noot

Prunus avium

kers

Pyrus communis

Peer

Familie **Rosaceae**.

Diagnostische kenmerken

Steunblaadjes aan de korte loten lintvormig, (6-)10-15 mm lang, meestal dicht bezet met witte of ook met bruine haren, vaak vroeg afvallend. Bladen cirkelrond tot eirond, kort toegespitst, fijn gezaagd, vlak, tenslotte vaak kaal, van onderen zonder uitspringende nerven; de steel langer tot weinig korter dan de schijf, zelden half zo lang als deze. Bloemen in een schermvormige tros; bloemkroon 2-4 cm in doorsnede, wit. Helmknoppen rood of paars. Vrucht meestal aan de voet versmald ('peervormig'), 2-4 cm lang, bij cultuurvormen meestal veel langer. Takken al of niet in dorens eindigend.

Hoogte bloeiende plant

Tot 18,00 m.

Bloeitijd

April-mei.

Standplaats

In bossen en bermen, meestal verwilderd.

Zeldzaamheid en verspreiding

In tal van vormen in cultuur om de eetbare vruchten.



Malus domestica

appel

Familie **Rosaceae**.

Diagnostische kenmerken

Steunblaadjes aan de korte loten priemvormig, 1,5-3,5 mm lang, of enkele ervan tot 5 mm lang, vaak spoedig kaler wordend en vaak zeer vroeg afvallend. Bladen bijna rond tot elliptisch, zelden langwerpig, kort toegespitst, fijn tot dubbel gezaagd, de rand iets naar beneden gebogen, spoedig kaal wordend of van onderen behaard tot viltig, van onderen met uitspringende zijnerf; de steel korter dan de schijf, meestal half zo lang als deze. Bloemen in een schermvormige tros, 2-4 cm in doorsnede, wit of roze. Helmknoppen geel. Vrucht rondachtig, aan de voet ingezonken, tot 3 cm breed, bij cultuurvormen veel

groter. Takken al of niet in dorens eindigend.

Hoogte bloeiende plant

Tot 10,00 m.

Bloeitijd

April-mei.

Standplaats

In bossen en bermen, meestal verwilderd.

Zeldzaamheid en verspreiding

In tal van vormen in cultuur om de eetbare vruchten.



Juglans regia

walnoot

Familie **Juglandaceae**.

Diagnostische kenmerken

Blaadjes (5-)7-9, vrijwel gaafrandig, aan de onderzijde in de nerfoksels behaard, overigens kaal, bij het wrijven aromatisch geurend. Vrucht ongeveer bolvormig, de vruchtschaal glad, groen met witte puntjes. Jonge takken kaal.

Hoogte bloeiende plant

Tot 30,00 m.

Bloeitijd

Mei.

Standplaats

In lichte bossen en struikgewas, in bermen.

Zeldzaamheid en verspreiding

Op vele plaatsen verspreid door het land ingeburgerd. Ook vaak aangeplant in tuinen en parken.

Oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Midden-Azië.



Prunus avium

kers

Familie **Rosaceae**.

Diagnostische kenmerken

Boom. Bladstelen 3-7 cm lang, overwegend aan de top met klieren. Bladschijf tot 15 cm lang, in de bloeitijd dun, rimpelig en van onderen min of meer behaard. Vrucht rood of zwartachtig, soms geelachtig.

Hoogte bloeiende plant

Tot 20,00 m.

Bloeitijd

Half april-mei.

Standplaats

Op vochtige, meer of minder voedselrijke grond in lichte loofbossen en houtwallen en langs wegen.

Zeldzaamheid en verspreiding

Algemeen in het Zuid-limburs district.



Hoveniersbedrijf Bernard Vonk vof
Teun Wassink
Boksheide 6
5571 NH Eersel
Tel: 06-55118982